

PrTK03 Programa de Tratamiento Pacientes



Inyección 1

Fecha:

- Por lo menos 2-8 semanas de empezar radiación (**XRT**).
- Comenzar a tomar el valaciclovir el día después de la inyección y continuarlo por 14 días.

Seguimiento

Fecha:

- Visita de seguimiento 1-2 semanas después de la inyección, puede ser el mismo día de la segunda inyección.
- Traer el diario de administración de valaciclovir a la visita



Inyección 2

Fecha:

- Al menos 2 semanas después de la 1a inyección.
- Comenzar a tomar el valaciclovir el día después de la inyección y continuarlo por 14 días.

Seguimiento

Fecha:

- Visita de seguimiento 1-2 semanas después de la inyección, puede ser el mismo día de la tercera inyección.
- Traer el diario de administración de valaciclovir a la visita



Inyección 3

Fecha:

- Al menos 2 semanas después de la 1a inyección.
- Comenzar a tomar el valaciclovir el día después de la inyección y continuarlo por 14 días.

Seguimiento

Fecha:

Visita de seguimiento 1-2 semanas después de la inyección.
Traer el diario de administración de valaciclovir a la visita.



Post-Tratamiento: Desde el fin de XRT

Visita 3 meses Fecha:

Visita 6 meses Fecha:

Visita 12 meses Fecha:

Visita 18 meses Fecha:



Biopsia de 2 años

Fecha:

- Las visitas de largo plazo continuarán cada seis meses después de la biopsia de 2 años y anualmente después de 5 años.

Empieza XRT

Fecha:

- XRT debe de empezar 0-3 días después de la segunda inyección.

Termina XRT

Fecha:

Para más información, por favor contacte:
